

WS 2009/10

# Diskrete Strukturen

Dr. Werner Meixner

Fakultät für Informatik  
TU München

<http://www14.in.tum.de/lehre/2009WS/ds/uebung/>

16. Dezember 2009

# ZÜ IX Hausaufgaben Blatt 8

## 1. Blatt 8, HA 2.1

Wie viele Zahlen zwischen 1 und 1000015 gibt es, so dass die Summe der einzelnen Ziffern  $\in \{0, \dots, 9\}$  ihrer Dezimaldarstellung genau 15 beträgt?

## Lösung:

Die Zahlen 1.000.000, 1.000.001, ..., 1.000.014, 1.000.015 müssen offenbar nicht mitgezählt werden, weil jede dieser Zahlen eine Quersumme unter 15 besitzt.

Es genügt also 6 Stellen der Dezimaldarstellung zu betrachten, dies sind die Zahlen von 1 bis 999 999 .

Wir verteilen  $n = 15$  Zähleinheiten mit dem Wert 1 auf die  $m = 6$  Stellen beliebig (Null ist zugelassen).

Wir interpretieren nun die Zuteilung von  $i$  Einheiten an die Stelle  $k$  so, dass

die Stelle  $k$  mit Vielfachheit  $i$  in eine zu bildende Multimenge aufgenommen wird.

Alternativ kann man das

Modell der Verteilung von gleichen Bällen auf unterscheidbare Urnen

benutzen.

Dann entspricht das genannte Verteilungsproblem einer Bestimmung der Anzahl  $anz_L$  der 15-elementigen Multiteilmengen einer 6-elementigen Menge.

Dies entspricht auch der Anzahl der Lösungs-6-Tupel  $x_1, x_2, \dots, x_6$  von  $\sum_{i=1}^6 x_i = 15$  für  $x_i \in \mathbb{N}_0$ .

Es gilt

$$anz_L = \binom{m+n-1}{n} = \binom{20}{15} = \binom{20}{5} = 19 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 3.$$

Damit gibt es 15504 Lösungen,  
die zur Zahldarstellung in [Frage](#) kommen.

Um eine gültige Dezimaldarstellung konstruieren zu können, müssen wir noch sicherstellen, dass  $x_i < 10$  für alle  $i$  gilt. Diese Bedingung kann höchstens für ein  $x_i$  verletzt sein.

Wir ziehen also diejenigen Fälle ab, wo genau ein  $x_i$  zwischen 10 und 15 liegt. Für  $x_i = j$  mit  $10 \leq j \leq 15$  ist die Zahl der Fälle für die übrigen 5 Stellen gegeben durch

$$\binom{15 - j + 5 - 1}{5 - 1}.$$

Wir erhalten durch Summierung über alle  $j$  für **jede der 6 Stellen  $i$**

$$\sum_{j=10}^{15} \binom{15 - j + 5 - 1}{5 - 1} = \sum_{j=0}^5 \binom{4 + j}{4} = \binom{10}{5} = 252.$$

Die allgemeine Formel für die zweite Summe wurde in Blatt 7, TA 4.1 gezeigt.

Damit erhalten wir für die Gesamtanzahl  $Anz$  verschiedener Zahlen zwischen 1 und 1.000.015 mit Ziffernsumme 15

$$Anz = 15504 - 6 \cdot 252 = 13992.$$

## 2. Blatt 8, HA 2.2

Wie viele Binärwörter der Länge  $n$  (nur Buchstaben 0 und 1) gibt es, die die Ziffernfolge "00" genau zweimal enthalten?

*Präzisierung:* In "000" ist die Ziffernfolge "00" an zwei Positionen, d.h. zweimal enthalten.

## Lösung:

Sei  $B_n$  die Menge der Binärwörter der Länge  $n$ , die die Ziffernfolge "00" genau zweimal enthalten.

Die Wörter aus  $B_n$  sind genau diejenigen Wörter  $w$  der Länge  $n$  und der Form

$$w = xyz \in \{0, 1\}^* \quad \text{mit} \quad x, y, z \in \{0, 1\}^*,$$

so dass

$x$  mit 0 endet,

$y$  mit 0 beginnt und mit 0 endet,

$z$  mit 0 beginnt

und insbesondere

$x, y, z$  keine aufeinanderfolgenden Nullen enthalten.

Sei  $d_x(k)$  die Anzahl der Wörter aus  $\{0, 1\}^*$  der Länge  $k$ , die keine aufeinanderfolgenden Nullen enthalten und mit 0 enden.

Sei  $d_y(k)$  die Anzahl der Wörter aus  $\{0, 1\}^*$  der Länge  $k$ , die sowohl mit 0 beginnen als auch mit 0 enden und keine aufeinanderfolgende Nullen enthalten.

Sei  $d_z(k)$  die Anzahl der Wörter aus  $\{0, 1\}^*$  der Länge  $k$ , die keine aufeinanderfolgenden Nullen enthalten und mit 0 beginnen.

Für die Gesamtanzahl  $|B_n|$  gilt dann

$$|B_n| = \sum_{\{(i,j,k) \mid i+j+k=n\}} d_x(i) \cdot d_y(j) \cdot d_z(k).$$

Wir bestimmen nun die  $d_x(k)$ ,  $d_y(k)$  und  $d_z(k)$ .

Sei  $d_x(k, i)$  die Anzahl der Wörter aus  $\{0, 1\}^*$  der Länge  $k$ , die  $i$  nicht aufeinanderfolgende Nullen enthalten und mit 0 enden.

Wenn  $i$  Nullen durch weitere  $i - 1$  Einsen getrennt sind, dann kann man

die restlichen  $k - 2i + 1$  Einsen

auf  $i$  Positionen vor und zwischen den  $i$  Positionen der Nullen

beliebig verteilen. Wir erhalten also

$$d_x(k, i) = \binom{i + (k - 2i + 1) - 1}{k - 2i + 1} = \binom{k - i}{i - 1}.$$

Für  $d_x(k)$  und  $d_z(k)$  gelten damit

$$d_x(k) = \sum_{i=1}^k \binom{k-i}{i-1},$$

$$d_z(k) = \sum_{i=1}^k \binom{k-i}{i-1}.$$

Die Bestimmung von  $d_y(k)$  unterscheidet sich geringfügig.

Sei  $d_y(k, i)$  die Anzahl der Wörter aus  $\{0, 1\}^*$  der Länge  $k$ , die  $i$  nicht aufeinanderfolgende Nullen enthalten und sowohl mit 0 beginnen als auch mit 0 enden.

Wenn  $i$  Nullen durch weitere  $i - 1$  Einsen getrennt sind, dann kann man

die restlichen  $k - 2i + 1$  Einsen

auf  $i - 1$  Positionen zwischen den  $i$  Positionen der Nullen

beliebig verteilen. Wir erhalten also

$$d_y(k, i) = \binom{(i - 1) + (k - 2i + 1) - 1}{k - 2i + 1} = \binom{k - i - 1}{i - 2}.$$

und damit

$$d_y(k) = \sum_{i=1}^k \binom{k - i - 1}{i - 2}.$$

### 3. Blatt 8, HA 3

Sei  $n \in \mathbb{N}$ . Wir betrachten Teilmengen  $B$  von  $[n]$ , die mindestens ein konsekutives Paar  $k, k + 1$  von natürlichen Zahlen enthalten und definieren

$$A_n = \{B \subseteq [n] \mid |B| = 3 \wedge \exists x, y \in B : x + 1 = y\}.$$

Bestimmen Sie  $|A_n|$  als arithmetische Formel, die von  $n$  abhängig ist, und begründen Sie Ihr Resultat.

*Hinweis:* Partitionieren Sie  $A_n$  in geeignete 3 disjunkte Klassen und bestimmen Sie zunächst die Anzahl der Elemente in jeder dieser Klassen.

## Lösung:

Für  $n \leq 2$  gilt offensichtlich  $|A_n| = 0$  und für  $n = 3$  gilt  $|A_n| = 1$ .

Das Folgende gilt für  $n \geq 4$ .

Eine 3-elementige Teilmenge von  $[n]$ , bestehend aus

$$a, b, c \in [n] \text{ mit } a < b < c,$$

die mindestens ein konsekutives Paar enthält, erfüllt genau eine der folgenden Bedingungen,

die gewisse **Positionsmuster** beschreiben.

$$\begin{aligned} B1: & \quad a = x + 1, \quad b = a + 1, \quad c = b + 2 + y, \quad n = c + z, \\ B2: & \quad a = x + 1, \quad b = a + 2 + y, \quad c = b + 1, \quad n = c + z, \\ B3: & \quad a = x + 1, \quad b = a + 1, \quad c = b + 1, \quad n = c + z, . \end{aligned}$$

wobei  $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ .

Wir bezeichnen die Menge aller 3-elementigen Teilmengen von  $[n]$ , die die Bedingung  $B_1$  erfüllen, mit  $B_1$ .

Entsprechend definieren wir  $B_2$  und  $B_3$ .

Folglich wird  $A_n$  durch die  $B_i$  partitioniert.

Nun bestimmt man die Anzahl  $|B_i|$ , indem man die noch freien Elemente auf  $x, y, z$  verteilt.

Bei den Positionsmustern  $B_1$  und  $B_2$  können  $n-4$  gleiche Elemente verteilt werden.

Die gesuchte Anzahl  $|B_1|$  bzw.  $|B_2|$  von Verteilungen ergibt sich als Anzahl der  $(n-4)$ -elementigen Multiteilmengen der 3-elementigen Menge  $\{x, y, z\}$ .

$|B_3|$  ergibt sich als Anzahl der  $(n-3)$ -elementigen Multiteilmengen der 2-elementigen Menge  $\{x, z\}$ .

Wir erhalten

$$|B_1| = \binom{3 + (n - 4) - 1}{n - 4} = \binom{n - 2}{2},$$

$$|B_2| = \binom{3 + (n - 4) - 1}{n - 4} = \binom{n - 2}{2},$$

$$|B_3| = \binom{2 + (n - 3) - 1}{n - 3} = n - 2,$$

und damit

$$|A_n| = |B_1| + |B_2| + |B_3| = (n - 2)^2.$$

## 4. Blatt 8, HA 4

Seien  $m, n \in \mathbb{N}$ . Eine Funktion  $f : [m] \rightarrow [n]$  wird **monoton** genannt, wenn für alle  $i, j \in [m]$  die folgende Implikation gilt.

$$i \leq j \implies f(i) \leq f(j).$$

Wie viele derartige Funktionen  $f$  gibt es in Abhängigkeit von  $m$  und  $n$ ?

Geben Sie eine Formel an und begründen Sie Ihr Ergebnis.

## Lösung:

Aus der Monotonie von  $f$  folgt, dass das Urbild  $f^{-1}(1)$  gleich einem Intervall  $[1, m_1]$  mit  $m_1 \in \mathbb{N}_0$  ist.

$m_1 = 0$  bedeutet, dass das Intervall bzw. das Urbild  $f^{-1}(1)$  leer ist.

Wir setzen aus formalen Gründen  $m_0 = 0$ ,  
dann gilt sogar für alle  $k \in [n]$  die Intervalldarstellung

$$f^{-1}(k) = [m_{k-1} + 1, m_k],$$

wobei für alle  $k \in \mathbb{N}$  gilt  $m_{k-1} \leq m_k$ .

Es folgt, dass die Abbildung  $f$  allein durch die Anzahl  $|[m_{k-1} + 1, m_k]|$  für alle  $k \in [n]$  festgelegt ist.

Als Nebenbedingung haben wir lediglich:

Die Summe aller „Längen“ der Intervalle ist gleich  $m$ .

Nun verteilen wir

$m$  gleiche Elemente auf  $n$  unterscheidbare Elemente

(Abbildungsmodell  $m$  gleiche Bälle auf  $n$  unterscheidbare Urnen)

und erhalten die Anzahl  $anz$  der verschiedenen Verteilungen als

Anzahl der  $m$ -elementigen Multiteilmengen  
einer Menge mit  $n$  Elementen, d. h.

$$anz = \binom{m + n - 1}{m}.$$